

MESURES VISANT À MINIMISER LA DIFFUSION DU VIRUS POUR UNE ACTIVITÉ DERMATO-CHIRURGICALE EN CABINET, EN CLINIQUE OU À L'HÔPITAL

- ⊙ Dépister les patients et le personnel avant l'entrée du cabinet : fièvre, toux, autres signes... (CS préopératoire : ne pas venir à l'intervention en cas de signes cliniques).
- ⊙ Affichage des mesures barrières dans la salle d'attente.
- ⊙ Gels SHA pour lavage des mains entre chaque manipulation (secrétariat et personnel soignant).
- ⊙ Maintien à distance du patient du personnel d'accueil (> un mètre).
- ⊙ Port d'un masque chirurgical pour le secrétariat et le personnel soignant.
- ⊙ Port d'un masque par le patient.
- ⊙ Limiter la manipulation d'objets par le patient dans le cabinet (boutons d'ascenseur, crayons, comptoir... Supprimer les magazines et les jouets dans la salle d'attente).
- ⊙ Limiter le nombre de patients dans la salle d'attente (distance de un mètre, un patient tous les deux sièges).
- ⊙ Limiter le nombre d'accompagnants : un maximum.
- ⊙ Nettoyez les chaises et les surfaces des salles d'attente avec un désinfectant. Pour les interventions au visage nécessitant une reconstruction prolongée, en particulier celles au niveau du nez ou des lèvres, utiliser un masque FFP2 et des écrans faciaux et/ou lunettes pour protéger les yeux.
- ⊙ Privilégier les sutures résorbables.
- ⊙ Nettoyez soigneusement les salles d'interventions, téléphones, interrupteurs, poignées d'éclairage, poignées de porte, avec un désinfectant antiviral après chaque patient.
- ⊙ Antiviral après chaque passage.
- ⊙ Gérer les questions et complications postopératoires par télé médecine de préférence (visio ou téléphone avec photos numériques).
- ⊙ Limiter les déplacements du patient, éviter en particulier les transports en commun.